

Modraszki i powszetatki

Czerwończyk żarek (*Lycaena phlaeas* L.) - motyl z rodziny modraszkwatych (Lycaenidae). Rozpiętość skrzydeł ok. 2,5 cm. Motyl pojawia się w dwóch pokoleniach: pierwsze lata od maja do połowy czerwca, drugie – od połowy lipca do drugiej dekady sierpnia. Gąsienice żerują na różnych gatunkach szczawiu. Motyl preferuje tereny otwarte i nasłonecznione. Gatunek pospolity.

Czerwończyk dukacik (*Lycaena virgauea* L.) - motyl z rodziny modraszkwatych (Lycaenidae). Rozpiętość skrzydeł ok. 3 cm. Występuje wyraźny dymorfizm płciowy. Motyl pojawia się w jednym pokoleniu w okresie od połowy czerwca do początków sierpnia. Gąsienice żyją na szczawiu zwyczajnym i szczawiu polnym. Dukacika od podobnego gatunku, chronionego czerwończyka nieparka (*Lycena dispar* Haw.) najłatwiej odróżnić po ceglasto pomarańczowym spodzie tylnych skrzydeł. U nieparka jest on niebieskawy.

Czerwończyk uroczek (*Lycaena tityrus* L.) - motyl z rodziny modraszkwatych (Lycaenidae). Rozpiętość skrzydeł ok. 3 cm. Występuje wyraźny dymorfizm płciowy. Motyl pojawia się w dwóch pokoleniach: pierwsze lata od maja do czerwca, drugie od końca lipca do końca sierpnia. Gąsienice żerują na szczawiu polnym i szczawiu zwyczajnym. Motyl w całej Polsce pospolity.

Czerwończyk zamgleniec (*Lycaena alciphron* Rott.) - motyl z rodziny modraszkwatych (Lycaenidae). Rozpiętość skrzydeł ok. 3,5 cm. Wyraźny dymorfizm płciowy – samce fioletowe z pomarańczowymi przejaśnieniami, samice brązowe. Motyl pojawia się w jednym pokoleniu od czerwca do końca lipca. Gąsienice żerują na szczawiu polnym i zwyczajnym. Motyle chętnie siadają na kwiatach macierzanki. Motyle preferują skraje lasów, łąki, polany. Występuje w całej Polsce, jednak dość rzadki.

Czerwończyk płomieniec (*Lycaena hippothoe* L.) - motyl z rodziny modraszkwatych (Lycaenidae). Rozpiętość skrzydeł ok. 3 cm. Wyraźny dymorfizm płciowy. Samica mniej atrakcyjnie ubarwiona od samca. Ma kolor ciemnobrązowy, z niewielkimi czerwonymi wstawkami. Motyl pojawia się w jednym pokoleniu od czerwca do połowy sierpnia. Gąsienice żyją na szczawiu zwyczajnym i rdeście wężownika. Motyl spotykany jest na wilgotnych łąkach i polanach. W Polsce dość rzadki.

Zieleńczyk ostrężyniec (*Callophrys rubi* L.) - motyl z rodziny modraszkwatych (Lycaenidae). Rozpiętość skrzydeł ok. 2,5 cm. Charakterystyczny zielony spód skrzydeł. Motyl pojawia się w jednym pokoleniu w okresie od połowy kwietnia do drugiej dekady maja. Gąsienice żerują na różnych roślinach m. in.: żarnowcu, derzeniu świdwa, kruszynie, borówce brusznica. Motyle najłatwiej spotkać na skrajach lasów.

Modraszek wieszczek (*Celastrina argiolus* L.) - motyl z rodziny modraszkwatych (Lycaenidae). Rozpiętość skrzydeł ok. 2,5 cm. Wyraźny dymorfizm płciowy. Motyl pojawia się w dwóch pokoleniach: pierwsze lata od połowy kwietnia do początków czerwca, drugie od końca czerwca do połowy sierpnia. Gąsienice żyją na kruszynie pospolitej, derzeniu, wrzosie i in. Motyl zasiedla wilgotne lasy liściaste, przyleśne łąki, torfowiska niskie. Gatunek pospolity w całym kraju.

Modraszek ikar (*Polyommatus icarus* L.) - motyl z rodziny modraszkwatych (Lycaenidae). Rozpiętość skrzydeł ok. 3 cm. Wyraźny dymorfizm płciowy. Motyl pojawia się w dwóch pokoleniach: pierwsze lata od połowy maja do końca czerwca, drugie od połowy lipca do końca sierpnia. Gąsienice żyją m. in. na komonicy zwyczajnej, lucernie, rzadziej koniczynie.

Powszatek brunatek (*Erynnis tages* L.) - motyl z rodziny powszatek (Hesperiidae). Rozpiętość skrzydeł motyla - ok. 2,5 cm. Motyl lata w dwóch pokoleniach od początków maja do końca sierpnia. Gąsienice żyją na komonicy zwyczajnej. Motyla spotkać można na polanach leśnych, łąkach, lata szybko, na niewielkiej wysokości nad ziemią. W Polsce dość pospolity.

Wiarcabnik ślazowiec (*Carcharodus alceae* Esp.) - motyl z rodziny powszatek (Hesperiidae). Rozpiętość skrzydeł - ok. 2,8 cm. Motyl pojawia się w dwóch pokoleniach: pierwsze lata od początku maja do końca czerwca, drugie od końca lipca do początku września. Gąsienice odżywiają się różnymi roślinami z rodziny malwowatych, zwłaszcza na ślazach. Motyl preferuje suche polany, skraje lasów, przydroża. W Polsce dość rzadki.

Powszatek malwowiec (*Pyrgus malvae* L.) - motyl z rodziny powszatek (Hesperiidae). Rozpiętość skrzydeł - ok. 2,5 cm. Motyl pojawia się w jednym pokoleniu od maja do końca czerwca. Gąsienice odżywiają

się liśćmi pięciornika gęsiego oraz innymi roślinami z rodziny różowatych. Motyla spotkać można na skrajach lasów, nasypach kolejowych, terenach ruderalnych.

Rojnik morfeusz (*Heteropterus morpheus* Pall.) - motyl z rodziny karłatkowatych (Hesperiidae). Jeden z największych krajowych motyli z tej rodziny o rozpiętości skrzydeł do 3,5 cm. Motyl występuje w jednym pokoleniu od połowy czerwca do końca sierpnia. Gąsienice odżywiają się liśćmi różnych gatunków traw np. trzęślicy modrej. Motyla spotkać można na podmokłych łąkach, przy rowach melioracyjnych itp.

Kosternik palemon (*Carterocephalus palaemon* Pall.) - motyl z rodziny powszelatkowatych (Hesperiidae). Rozpiętość skrzydeł – ok. 2,5 cm. Motyl pojawia się w jednym pokoleniu od połowy maja do końca czerwca. Gąsienice żyją na różnych gatunkach traw. Motyle spotkać można na skrajach lasów, leśne drogi, śródleśne łąki. W Polsce dość często spotykany.

Karłatek leśny (*Thymelicus silvestris* Pod.) - motyl należy do rodziny powszelatkowatych (Hesperiidae). Rozpiętość skrzydeł – ok. 2,7 cm. Motyle pojawiają się w jednym pokoleniu od końca czerwca do połowy sierpnia. Gąsienice odżywiają się różnymi gatunkami traw. Motyle spotykane można na polanach i drogach leśnych. W Polsce spotykany na obszarze całego kraju.